PRODATEC

RUMIVAC

ESPECIAL VACAS DE LECHE

RUMIVAC

RUMIVAC es una premezcla vitamínico-mineral diseñada especialmente para solucionar todos aquellos problemas característicos de las explotaciones de vacas de leche, es decir:

- Cojeras
- Retrasos de entrada de celo
- Repeticiones de celo
- Retención de secundinas
- Producción láctea reducida
- Terneros con poco peso al nacimiento
- Diarreas neonatales en terneros

Para alimentar a una vaca lechera de manera que se cubran sus **Necesidades de Mantenimiento y de Producción** hay que suministrar una dieta equilibrada, y en cantidad suficiente.

RUMIVAC se suministra a vacas tanto gestantes como en lactación, variando la dosis a administrar en función del nivel de producción del animal.

RUMIVAC puede administrarse como suplemento de **cualquier plan de alimentación** e independientemente del tipo de corrector usado.

Los resultados del uso de **RUMIVAC** son observables a las pocas semanas de tratamiento.

DOSIFICACION

Suplementar la dieta con 10gr. de RUMIVAC por litro de leche en producción.

PRODUCCION LACTEA	RUMIVAC
25 litros	250gr/día
30 litros	300gr/día
35 litros	350gr/día
40 litros	400gr/día
Más de 40 litros	400gr/día
Vacas secas	80gr/día

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA VACA LECHERA

- ES NECESARIO REGULAR LA PRODUCCION DE LECHE obteniendo niveles óptimos, y manteniendo la densidad y el nivel de grasa de la misma. La vaca no debe producir mas litros/día de los que corresponden por calidad genética, pero tampoco menos.
- HAY QUE MANTENER LA ETAPA DE ALTA PRODUCCION LECHERA, para poder obtener una buena media-global en la explotación. Después de dar los calostros empieza a subir la producción y esta etapa dura 100 días aproximadamente. Si no se cubren sus necesidades, la vaca va perdiendo vitalidad y esta etapa queda reducida a 70-80 días.
- SE DEBE OBTENER UN BUEN INDICE DE FERTILIDAD, reduciendo los abortos y las faltas de salida en celo. No hay que olvidar que una vaca que no pare es una vaca que no da leche. Todas las deficiencias alimentarias se traducen en pérdidas económicas.
- CONVIENE REDUCIR LOS CASOS DE RETENCION PLACENTARIA, pues cuanto antes echa la placenta, antes queda limpia. Pueden quedar retenidos algunos trozos de placenta, originarse una metritis, y salir la leche contaminada. Puede morir el ternero, e incluso puede morir la vaca.
- HAY QUE CONSEGUIR MAYOR VITALIDAD EN EL RECIEN NACIDO, lo cual viene determinado por diversos factores. Si el calcio y el fósforo han formado un buen esqueleto, el animal nace más sano y es más fácil que viva. La suplementación vitamínica - mineral que habremos aportado a la madre ayudará a fortalecer al ternero.
- LOS DEFICITS VITAMINICO—MINERALES son caros de diagnosticar, y, sobretodo caros de resolver. Llega un momento en que la vaca ya no produce con regularidad, se forman quistes ováricos, y, finalmente hay que sacrificarla.

FICHA TÉCNICA

RUMIVAC

PREMEZCLA
RUMIVAC MINERAL VACAS

Utilización reservada exclusivamente
a la fabricación de alimentos para animales.
Premezcla vitamínico-mineral para incorporar al pienso.

Para ganado vacuno - Vacas en gestación y lactación.
Modo de empleo : Dosificarlo al 3,00% (30 kgs./tm. De pienso)

COMPOSICIÓN POR KG/PRODUCTO

Vitaminas, pro-vitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo

E-672 Vitamina A	300.000,00 UI
E-671 Vitamina D3	32000,00 UI
" E (Acetato 1 - & tocoferol)	1297,00 mgrs
" B1 (Tiamina clorhidrato)	32,00 mgrs
" B2 (Riboflavina)	122,00 mgrs
" B6 (Piridoxina clorhidrato)	61,00 mgrs
" B12	0,47 mgrs
" K3 (Menadiona sodio bisulf.)	32,00 mgrs
Ácido nicotínico	406,00 mgrs
Ácido pantoténico (pantotenato cálcico)	244,00 mgrs
Vitamina C (Acido ascórbico)	1054,00 mgrs

Oligoelementos o compuestos de oligoelementos

E-5 Manganeso (f./óxido manganoso)	1020,00 mgrs
E-1 Hierro (f./ sulfato de hierro heptahidratado)	892,00 mgrs
E-4 Cobre (f./ sulfato cúprico pentahidratado)	125,00 mgrs
E-3 Cobalto (f./carbonato básico cobaltoso monohidratado)	3,00 mgrs
E-6 Cinc (f./óxido de cinc)	765,00 mgrs
E-2 Yodo (f./ yoduro potásico)	13,00 mgrs
E-8 Selenio (f./ selenito sódico)	5,00 mgrs

Soporte

Oxido de magnesio	2550,00 mgrs
Flor de azufre	1912,00 mgrs
Sal (cloruro sódico)	140000,00 mgrs
Calcio (f./carbonato cálcico)	142430,00 mgrs
Fósforo (f./fosfato bicálcico)	48480,00 mgrs
Bicarbonato sódico	35000,00 mgrs

PERIODO DE UTILIZACIÓN : De manera continua.

PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN TÉCNICA S.L.
Calle Mont Llorer, 1
Polígono "Molí de les Planes"
08470 SANT CELONI (Barcelona)
Nº αESP08100078

Nº Lote : Ver envase.
Peso neto : 30 kgs.
Fórmula Nº : 4.012

FECHA LÍMITE DE GARANTÍA DEL CONTENIDO : Ver envase.
FABRICADO 6 MESES ANTES DE LA FECHA DE DURABILIDAD INDICADA